

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2017-05-09

(19. hét)

Fenofázis: rügyfakadás, „intenzív hajtásnövekedés” (heterogén, sápkóros, betökösödött hajtásnövekmény. Barkásodó rügyektől a max. 30 cm-es hajtáshosszal bezáródóan akár ernyő művelés esetében egyazon szálvesszőn belül is).

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyiség 15,3 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a változékony jelenleg hűvös csapadékos időjárás következtében **gyenge lisztharmat veszélyt** jeleznek. Lisztharmat ellen kontakthatású készítményekkel preventív védekezés javasolt.

Kontakthatású kénkészítmények használata esetén figyelembe kell venni azt, hogy ezek a növényvédő szerek hatékonysága csak 15 C° felett érvényesül.

Az elmúlt hetek hűvös időjárása miatt vontatott volt a hajtásnövekedés, mely kedvező volt a levél és gubacsatkák felszaporodásának az ültetvényekben. Ellenük gyérítő jelleggel a nagyobb koncentrációjú kén készítmények is hatásosak lehetnek. Súlyosabb kárkép esetében viszont speciális atka- és rovarölő szerek kijuttatása javasolt.

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontaktkészítmények alkalmazásával.

(Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenése várható. Ez még ugyan várat magára, de az elmúlt heti esőt hozó frontok délről érkeztek, mellyel szaporító képletek is érkezhettek az ország területére.).

Az áprilisi „télben” nem csak hó esett, de április 19,20 és 21-én is az előrejelző készülék (Badacsonyan) kevéssel fagypon alatti (-0,2 -0,5 C°) hőmérsékletet is regisztrált 2 m magasságban. Ezek a hőmérsékleti értékek túl vannak a hideghatás fogalmán, ezek fajtától és fejlettségtől függően fagyási sérüléseket okoztak a fakadó szőlőkben nem csak a fagyzugos, hanem a borvidék alacsonyabban és magasabban fekvő területein is. Fagypon alatti hőmérséklet egyes ültetvényekben jelentős fagykárt okozott (15-20 %, de helyenként akár 50 % is volt).

A fagyosszentek „jótékony” hatásától az égiek óvjanak minket! Az előttünk álló éjszakán és hajnalon (04.09-04.10) remélhetőleg nem lesz újra fagy.

Az elmúlt hetek viharos szeles időjárása a gyenge hajtásnövekedésnek köszönhetően (nem volt felület) nem okozott szélkárt az ültetvényekben.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Figyelem: A hét elején szeles hidegfrontok alakították időjárásunkat, a hét közepén szerda reggelre akár az előrejelzések alapján fagyokra is kell számítani. A hét második felébe felmelegedés 20-23 C°-os maximum hőmérséklet várható. A héten jelentősebb mennyiségű csapadék pénteken, szombaton és vasárnap is várható. Szerdán és csütörtökön szeles napra számíthatunk.

Az elmúlt hetekben a csapdázott szőlőmolyok (tarka szőlőmoly) mennyisége megugrott, ezért a különböző területeken egyedi számlálás (gazda által) esetén a rovarölő szer hatásmechanizmusát figyelembe véve indokolt lehet a rovarölő szeres kezelés elvégzése.

Ezen a héten a BASF növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés alapján:

Lisztharmat ellen: Kumulus S,

Peronoszpóra ellen: Delan 700 WG, Polyram DF

Szőlómolyok ellen: Fendona 10 EC

Ezen a héten a Syngenta növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés alapján:

Lisztharmat ellen: ThiovitJet

Peronoszpóra ellen: Bravo 500, Neoram 37,5 WG

Szőlómolyok ellen: KarateZeon 5 Cs

Atkák és tripszek ellen: Vertimec Pro kizárólag önmagába kijuttatva AKG-s területeken egy tenyészidőszakban legfeljebb egy alkalommal használható

Badacsony, 2017. május 9.