

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2017-05-18

(20. hét)

Fenofázis: intenzív hajtásnövekedés

Májusi eső aranyat érne, ha esne.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyiség összesen 2,5 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a változékony időjárásnak köszönhetően **gyenge, közepes lisztharmat veszélyt** jeleznek. A héten várható felmelegedésnek (pénteken akár 30 C°-is lehet) köszönhetően a lisztharmat veszély erősödni fog. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt vagy felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Kontaktthatású kénkészítmények használata esetén figyelembe kell venni azt, hogy ezek a növényvédő szerek hatékonysága csak 15 C° felett érvényesül.

Az elmúlt hetek hűvös időjárása miatt vontatott volt a hajtásnövekedés, mely kedvező volt a levél és gubacsatkák felszaporodásának az ültetvényekben. Ellenük gyérítő jelleggel a nagyobb koncentrációjú kén készítmények is hatásosak lehetnek. Súlyosabb kárkép esetében viszont speciális atka- és rovarölő szerek kijuttatása javasolt.

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontaktkészítmények alkalmazásával.

(Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenése várható. Ez még ugyan várat magára, de a 18. heti esőt hozó frontok délről érkeztek, mellyel szaporító képletek is érkezhettek az ország területére. A hétvégén ismét délről érkező remélhetőleg áztató esőt és nem csak peronoszpórát hozó frontra lehet számítani.).

A fagyosszentek „jótékony” hatásától nem makulátlanul ugyan, de az égiek megóvtak minket! 05.09-05.10-én a fagyzugos, alacsonyabban fekvő területeken ismét tavaszi fagykárokat okozott az éjszakai lehűlés, de nem katasztrofális mértékben.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Figyelem: A hét második felébe felmelegedés pénteken 25-30 C°-os maximum hőmérséklet várható. A hétvégén mérséklődik a felmelegedés, jelentősebb mennyiségű csapadék szombat este és vasárnap hajnalban eshet. Szombaton és vasárnap szeles napra számíthatunk.

Az elmúlt hetekben a csapdázott szőlómolyok (tarka szőlómoly) mennyisége megugrott, ezért a különböző területeken egyedi számlálás (gazda által) esetén a rovarölő szer hatásmechanizmusát figyelembe véve indokolt lehet a rovarölő szeres kezelés elvégzése.

Ezen a héten a BASF növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés alapján:

Lisztharmat ellen: Kumulus S, (Sercadis, Vivando)

Peronoszpóra ellen: Delan 700 WG, Polyram DF, (Acrobat MZ WG)

Szőlómolyok ellen: Fendona 10 EC

Ezen a héten a Syngenta növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés alapján:

Lisztharmat ellen: ThiovitJet, Topas 100EC, Dynali

Peronoszpóra ellen: Bravo 500, Neoram 37,5 WG (Ridomil Gold MZ 68 WG)

Szőlőmolyok ellen: KarateZeon 5 Cs, Affirm

Atkák és tripszek ellen: Vertimec Pro kizárólag önmagába kijuttatva AKG-s területeken egy tenyészedőszakban legfeljebb egy alkalommal használható

A Kormányhivatal növényvédelmi felügyelői megtalálták a borvidéken az amerikai szőlőkabóca L1-es lárváját, de jelenleg ellenük védekezni még nem kell.

Kifejezetten a kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, amikor a lárvák eléri az L₂-L₃ lárvastádiumot.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Megyei Kormányhivatal közeljövőben megjelenő az idei évre szőlő védekezési felhívását!

Badacsony, 2017. május 18.