



VESZPRÉM MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

## VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

A szőlő arany színű sárgaság betegségét okozó *Grapevine flavescence dorée* zárlati károsítót Veszprém megyében először 2013-ban, majd az azt követő években a Badacsony-hegyen és környékén azonosította be a Veszprém Megyei Kormányhivatal. A betegség visszaszorítása és továbbterjedésének megakadályozása érdekében növény-egészségügyi zárlat került elrendelésre a fertőzött területeken és a határaiktól számított 3 km sugarú részt pedig puffer zónának (továbbiakban együtt: körülhatárolt terület) jelölték ki.

A körülhatárolt területen található szőlőültetvényekben elvégzett felmérések szerint a szőlő arany színű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) lárvakelése 2019. év májusának harmadik hetében kezdődött meg, majd a következő héten második lárvastádiumú egyedek is megtalálhatóak voltak.

A kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca előfordulása esetén, egyedszámának visszaszorítása érdekében kötelező növény-védőszeres védekezéseket végezni, melyeket azok optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével kell végrehajtani.

**A Veszprémi Járási Hivatal vizsgálati alapján az első kezelést a szőlő virágzása után, de legkésőbb 2019. június 30. napjáig, a második kezelést, 2-3 hét múlva, de legkorábban július első felében kell elvégezni a körülhatárolt területen és a Balaton-felvidéki borvidék ezzel határos településein.**

A kifejezett egyedek elleni harmadik kezelésre újabb védekezési felhívás kerül kiadásra a kabóca csapdák fogási eredménye alapján. Az eredményes növényvédelem feltétele, hogy a kötelező kezeléseket előtt a szőlőnövénnyeken a törzstisztítás elvégzésre kerüljön.

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY  
NOVÉNY- ÉS TALAIVÉDELMI OSZTÁLY  
8200 Veszprém, Dózsa György u.33. levelezési cím: 8200.Veszprém, Pf. 1001  
telefon: 88/590-472. fax: 88/590-478. e-mail: [veszprem.noveny.talaitved@veszprem.gov.hu](mailto:veszprem.noveny.talaitved@veszprem.gov.hu)

A osemege- és borszőlő állományokban a védekezésre alábbi táblázatban szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók:

Kabócák ellen engedélyezett szerek szőlőben	Forgalmazási kategória	A kezelés évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam	Az utolsó kezelés fenosztádiuma
Bulldock 25 EC	II.	2	14 nap	érés kezdetéig (BBCH 81), de a firtkezdemények növekedésétől (BBCH 55) a virágzás végéig (BBCH 69) nem alkalmazható
Daskor	I.	1	-	firtzáródás (BBCH 79)
Roska	I.	1	-	firtzáródás (BBCH 79)
Decis	III.	2	14 nap	zsendülési (BBCH 85)
Decis Mega	II.	3	14 nap	zsendülési (BBCH 85)
Fendona 10 EC	II.; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Érbea	II.; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
King 10 F	II.; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Litac Super	II.; III.	2	14 nap	érés kezdete (BBCH 81)
Kaiso EG	II.	1	-	firtzáródás (BBCH 78)
Kaiso Garden	III.	1	-	firtzáródás (BBCH 78)
Karate Zeon 5 CS	III.	2	10 nap	firtzáródás (BBCH 78)
Laser	II.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt (BBCH 84)
Klartan 24 EW	II.; III.	2	14 nap	érés kezdete, bogycsözneződés (BBCH 80)
Spin Tor	II.; III.	2	7 nap	két héttel a betakarítás előtt amerikai (BBCH 84)
Sivanto Prime	II.	1	-	firtvirágzat nyúlása-zsendülési (BBCH57-81)
Reidan 22 EC	I.	2	7 nap	firtzáródás (BBCH 78)

Kérem a védekezést a betegség visszaszorítása és továbbterjedése érdekében soron kívül elvégezni szíveskedjenek.

**Veszprém, 2019.05.29**

Bencsik Zsolt  
járási hivatalvezető  
névében és megbízásából:  
Odor Tamás  
osztályvezető

