

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2024-04-29

(18. hét)

Nem szokványosan indult ez az év. A rendkívül enyhe időjárásnak köszönhetően a természet és a szőlő sem hazudtolta meg önmagát. Kedvező körülmények között él és élni akar. Az előző évekhez képest 2-3- hét előnyben van a természet, de növényvédelem szempontjából nem biztos, hogy előnyösnek tekinthető. Főleg nem a pénztárcáknak.

2019.05.16-án írtam ezt a szösszenetet (kicsit aktualizáltam) ez mostanra is igaz úgy látszik a történelem ismétli önmagát igaz jelenleg még csak április végét írunk.

Fenofázis: „intenzív hajtásnövekedés” (heterogén, sápkóros hajtások), **fürtmegnyúlás**. Barkásodó rügyektől max. 60 cm-es hajtáshosszal bezárólag szinte minden köztes hosszúság megtalálható a tőkéken.

2019.05.16

A fagyosszentek nem hazudtolták meg magukat. A borvidéken a mélyen fekvő fagyzugos területeken azért megcsípték a szőlő hajtásait, de szerencsére jelentős kárt nem okoztak. Az akác virágzik, a kedvezőtlen időjárás miatt sajnos nem csak a méhek nem tudnak dolgozni, hanem a gazdákat is hátráltatja a növényvédelmi- és agrotechnikai munkák elvégzésében.

2024.04.29.

A fagyosszentek remélhetőleg idén nem okoznak meglepetést. Az akác virágzik, a kedvezőtlen időjárás miatt sajnos nem csak a méhek nem tudnak dolgozni, hanem a gazdákat is hátráltatja a növényvédelmi- és agrotechnikai munkák elvégzésében.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyiség 11,5 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a változékony jelenleg mérsékelt meleg harmatos időjárás következtében **gyenge lisztharmat veszélyt** jeleznek. Az aszkospórás fertőzéshez szükséges feltételek április közepén teljesültek. Primer fertőzés tüneteket még nem, de zászlos hajtást és a hajtás körüli másodlagos fertőzéseket találtam. Lisztharmat ellen kontakthatású és felszívódó készítményekkel preventív védekezés javasolt.

Kontakthatású kénkészítmények használata esetén figyelembe kell venni azt, hogy ezek a növényvédő szerek hatékonysága csak 15 C° felett érvényesül.

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy felszívódó készítmények alkalmazásával.

(Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenése várható. Ez még ugyan várat magára, de a héten jelentősebb esőt hozó frontokra kell számítani.

S. Pálincás Gyula: A szőlő peronoszpórája című írásából „Borászati Lapok” Kiadása Budapest, 1941 „Szakasztott így van ez a peronoszpóra fellépésével is. Hiában esős, nedves az idő, nem csírázik ki a télispóra, ha hidegek járnak, de viszont akkor sem, ha meleg ugyan az időjárás, azonban szárazság uralkodik. Mindaddig elhevernek a levéltörmelékben, bogyófoszladékokban és mindaddig nem ébrednek fel téli álmukból, amíg minden kedvező körülmény össze nem találkozik, azaz a kellő meleg és nedvesség, mert e nélkül nem csírázhatnak ki. Amihelyest az idő annyira felmelegedett, hogy az ötnapi középhőmérséklet (pentád) eléri a 14 C°-ot és egyúttal nagyobb esők is hullanak, akkor a télispórák már kicsírázhatnak...”

Az elmúlt hetek viharos szeles időjárása a gyenge hajtásnövekedésnek köszönhetően (nem volt felület) nem okozott jelentős szélkárt az ültetvényekben. A héten várható szeles idő viszont a korai illetve nagyobb levelű fajtáknál (Kéknyelű, Rózsakő, Favorit, Juhfark stb.) ahol már kialakult egy nagyobb felület ott károkat okozhat.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

A változékony időjárása miatt vontatott volt a hajtásnövekedés, mely kedvező volt a levél és gubacsatkák felszaporodásának az ültetvényekben. Ellenük gyérítő jelleggel a nagyobb koncentrációjú kén készítmények is hatásosak lehetnek. A tripszek jelenléte is megfigyelhető egy-egy ültetvényben. Súlyosabb kárkép esetén viszont speciális atka- és rovarölő szerek kijuttatása javasolt.

A csapdázott szőlőmolyok (tarka szőlőmoly) mennyisége megugrott, ezért a különböző területeken egyedi számlálás (gazda által) esetén a rovarölő szer hatásmechanizmusát figyelembe véve indokolt lehet a rovarölő szeres kezelés elvégzése.

A növényvédelmi fordulók (gyomirtás és lombkezelések), valamint a **zöldmunkák** (hajtásigazítás és kötözés, törzstisztítás) időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Figyelem: Az elmúlt héten szinte „novemberi” időjárás volt viharos széllel és csapadékkal. A hét elején felmelegedés 25-26 C°-os maximum hőmérséklet ígérkezik, de sajnos az előrejelzések alapján nem lesz hosszú életű, a hét második felében csütörtöktől ismét visszaesik a hőmérséklet és jelentős mennyiségű csapadék is várható. A héten jelentősebb mennyiségű csapadék helyenként csütörtök délutántól záporok, zivatarok formájában lehetnek. Vasárnap megélénkül ismét a légmozgás.

Erdőszéleken főleg, de belterületen is tapasztalható az őzek, szarvasok és vaddisznók jelenléte és a kártételük is. A malacos koca „kondája”, az őzek és szarvasok éjszakai duhajkodásának nyomai tetten érhetők nyomok, letépett, lecsípett, leszakított hajtások formájában. Mára már annyira felbátorodtak, hogy fényes nappal is megfigyelhetjük a vadat az ültetvényekben. Belterületen a vaddisznókérdés nem csak a vadásztársaság felelőssége, hanem önkormányzati és lakossági felelősség is. Ha mindenki az elhanyagolt területeket rendbe tartaná, a háztartási hulladékot megfelelően tárolná elszállításig, valamint az év során a hullott gyümölcsöt is összeszedné, akkor lényegesen kevesebb lenne a vaddisznók által okozott bosszúság.

Reményeim szerint a későbbiekben június-júliustól (mikor a kis csíkosak már önálló életre képesek) a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai élve befogó csapdákkal tovább gyérítik a vaddisznó populációt.

Badacsony, 2024. április 29.