

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2024-05-13

(20. hét)

Fenofázis: intenzív hajtásnövekedés, fürtmegnyúlás, (védett déli fekvésű helyeken korai fajtáknál virágzás kezdett)

Az időjárási előrejelzéseket figyelve úgy tűnik, hogy idén a fagyosszentek nem fogják tiszteletüket tenni a szőlőültetvényekben, az égiek megóvnak tőlük, elkerülnek minket.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyiség összesen 16,5 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. Az elmúlt heti csapadéknak köszönhetően megjelentek az első aszkospórák (primer) fertőzések az idősebb fás részekhez közeli apró levelek fonákán (A szőlő még szép, de ha most nem kellőképpen védekezünk a lisztharmat ellen, akkor későbbiekben komoly lisztharmatfertőzés is kialakulhat.) Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt vagy felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Kontakthatású kénkészítmények használata esetén figyelembe kell venni azt, hogy ezek a növényvédő szerek hatékonysága csak 15 C° felett érvényesül.

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával.

(Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenése várható. 10 mm feletti esőt (a múlt héten egyszerre leesett csapadék mennyisége Badacsonyan még nem 8,0 mm, de Kisapáti 23,0 mm, Nemesgulács 16,0 mm környékén már teljesültek a fertőzéshez szükséges feltételek) követően a kórképek megjelenésére lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Fel kell készülni virágzástól kezdve a feketerothadás veszélyére is, ha meleg csapadékosra fordulna az időjárás.

Figyelem: A héten fokozatosan melegszik az idő 23-25 C°-os maximum hőmérséklet várható. Szeles napoknak nézünk elébe. Csütörtöktől a csapadékhajlam nő. Jelentősebb mennyiségű csapadék csütörtök délutántól várható, péntek kifejezetten esősnek ígérkezik. A hétvégén változékony, szeles időre lehet számítani.

Az elmúlt hetek hűvös időjárása miatt vontatott volt a hajtásnövekedés, mely kedvezett a levél és gubacsatkák felszaporodásának az idősebb és fiatalabb ültetvényekben egyaránt. Ellenük gyérítő jelleggel a nagyobb koncentrációjú kén készítmények is hatásosak lehetnek. Súlyosabb kárkép esetében viszont speciális atkaölő szerek kijuttatása javasolt.

A csapdázott szőlőmolyok (tarka szőlőmoly) mennyisége megugrott, ezért a különböző területeken egyedi számlálás (gazda által) esetén a rovarölő szer hatásmechanizmusát figyelembe véve indokolt lehet a rovarölő szeres kezelés elvégzése.

A szőlő levelein megfigyelhetőek elvétve a kígyóaknás szőlőmoly kárképei is.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvény szinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Időszerűvé válik a virágzáskori levélminták leadása.

Kérem használják ki a borvidékünkön Badacsonyan található akkreditált laboratórium MATE Laborközpont Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Vizsgálólaboratórium (87/ 532-209) szolgáltatásait.

A növényvédelmi fordulók (gyomirtás és lombkezelések), valamint a **zöldmunkák** (hajtásigazítás és kötözés, törzstisztítás) időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében. Ha virágzik a szőlő, akkor is el lehet, sőt el kell végezni a hajtásigazítást, törzstisztítást és a permetezést!

Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L1-es lárváját megtaláltuk, de jelenleg ellenük védekezni még nem kell.

Kifejezetten a kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, amikor a lárvák eléri az L₂-L₃ lárvastádiumot.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közeljövőben megjelenő aktuális védekezési felhívását!

Badacsony, 2024. május 13.