

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2024-05-27

(22. hét)

Fenofázis: virágzás kezdet, virágzás vége, tisztulás, zöldbors nagyság

Még tőkén belül is heterogén a virágzás menete, valamelyik fürt csak most kezd virágozni, de vannak olyan fürtök, amelyek már a tisztuláson is túl vannak. Összességében Badacsonyan a késői fajták virágzás végén, tisztulásban, míg a korai és középérésű fajták bogyói zöldbors nagyságban vannak.

A múlt héten Badacsonyan 14,4 mm csapadék esett. Majdnem minden nap esett több kevesebb csapadék és harmatképződés is volt többször.

A szőlőnek rendkívül kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően a hajtásnövekedés folyamatos volt. A visszahajló vitorlák már egyes fajták estében átláthatatlan dzsungelt képeznek a sorközök felett akadályozva a gépi munkák elvégzését, valamint kedvező mikroklímát biztosítanak elsősorban a lisztharmat gomba felszaporodásához.

Péter Pál ide vagy oda (június 29), de lassan mérlegelni és meg kell barátkozni a csonkázás elkezdésének gondolatával is.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt nyári időjárásnak köszönhetően **erős és tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. Lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával.

(Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenése várható. 10 mm feletti esőt (a múlt héten is teljesültek a fertőzéshez szükséges feltételek) követően a kórképek megjelenésére lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges, de a még virágzó fajtáknál preventíven indokolt.

A peronoszpóra, feketerothadás váratott magára, de az elmúlt heti és a mostani csapadékos időjárásnak és a déli áramlásnak köszönhetően komolyan oda kell figyelni mindkét kórokozó megjelenésére is.

Figyelem: A héten marad a fülledt nyári idő. 23-25 C° maximum hőmérséklet mellett a megnövekvő gomolyfelhőzetből záporokra, zivatarokra lehet számítani. Pénteken és szombaton nagyobb mennyiségű eső várható, de a jelenlegi számítások szerint úgy tűnik, hogy a hétvégét sem ússzuk meg szárazon. Kedd, Szerda és péntek szeles napnak ígérkezik.

A növényvédelmi fordulók (gyomirtás és lombkezelések), valamint a **zöldmunkák** (hajtásigazítás és kötözés, törzstisztítás) időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Időszerű a virágzáskori levélminták leadása.

Kérem használják ki a borvidékünkön Badacsonyan található akkreditált laboratórium MATE Laborközpont Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Vizsgálólaboratórium (87/ 532-209) szolgáltatásait.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, melynek most jött, illetve fog eljönni az ideje. Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L2-es lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. A lárvák (L₂-L₃) most érték el vagy most fogják elérni a borvidék számos pontján azt a fejlettséget, hogy ellenük célzottan és eredményesen védekezni tudjunk.

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2024. május 27.