

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2024-06-17

(25. hét)

Fenofázis: fürtzáródás előtt, fürtzáródás, zsendülés kezdet (Csabagyöngye egy-egy bogyója Badacsonyan részlegesen megzsendült)

2019-ben írtam ezt a pár sort, ami az elkövetkező napokra is igaznak bizonyul.

Nincs új a nap alatt.

Öregapám mondaná: Fiam ne menj horgászni, most csak a keszegbogarakat (zöld árvaszúnyog) eszi a hal. Kapálni kék menni, mert a dudva megfojtja a tükéket. Valóban esténként füstölve, gomolyogva énekelnek az árvaszúnyogok némi dalos és gyötrő szúnyog társaságában. A szúnyogok továbbra is röpdösnek a horgászok bánatára, a fecskék örömeire, akik továbbra is fogdoshatják őket. Minden rosszban van egy kis jó is. ☺) A gaz meg csak nő (jobb esetben még a tőkék alatt), amit nem győzünk kordában tartani.

Badacsonyan a késői érésű fajták fürtjei a fürtzáródás előtti, valamint fürtzáródásban, míg a középérésű fajták fürtjei fürtzáródásban vannak. A korai fajták bogyói zsendülés kezdetén vannak, a kék szőlő fajták színesednek.

Peronoszpóra lassan már csak a lombot tudja megbetegíteni. A lisztharmatnak sincs már sok ideje hátra, ahhoz, hogy a fürtöket fertőzni tudja. 1-2 hét múlva már csak a lombot tudja károsítani, de addig még meglepetéseket is okozhat.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 7,7 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek **erős lisztharmat veszélyt** jeleznek.

A bogyók héja kezd elviaszosodni, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Lisztharmat ellen kontakt vagy felszívódó készítményekkel védekezni kell.

25°C felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy még felszívódó készítmények alkalmazásával.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján **nem szükséges**.

Feketerothadás ellen preventív védekezés javasolható. Levéltünetek megjelentek a borvidéken.

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben. Júliusban a fitoplazma tüneteinek megjelenésére is számítani kell. Ezen tőkéket célszerű megjelölni és lehetőleg eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az ESCA-s szőlőtőkét részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.

Figyelem: A héten péntekig marad a kánikula 30-35 °C maximum hőmérséklettel. Szombaton egy hidegfrontnak köszönhetően záporok, zivatarok alakulhatnak ki az esti óráktól kezdve. A hőmérséklet fokozatos csökkenése mellett 25-27 °C maximum várható. A hét második fele szelesnek ígérkezik. „Jelentősebb” csapadék a hét végén és jelentős mennyiség jövőhét elején hétfőn és kedden lehet. Záporok és zivatarok lokálisan főleg a délutáni gomolyfelhőkből bármikor kialakulhatnak.

A növényvédelmi forduló, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében. A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékelt levelezzenek a fűrtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

A hatalmas hajtásnövekmény dunsztot képez a szőlősorokban. Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

A korai és középérésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

A zöld cserebogarakból 06.10 és 06.17 között 19 db-ot fogott Badacsonyan a varsás csapda.

A tarka szőlőmoly második nemzedékének a rajzása elkezdődött, ezért a különböző területeken egyedi számlálás (gazda által) esetén a rajzáscsúcsot követően a rovarölő szer hatásmechanizmusát figyelembe véve célszerű az inszekticides kezelést elvégezni.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, melynek most jött el az ideje. Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L₄-L₅-ös lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. A lárvák (L₃-L₄) most érték el a borvidék számos pontján azt a fejlettséget, hogy ellenük célzottan és eredményesen védekezni tudjunk.

A KABÓCÁK ELLENI VÉDELEM KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDELEM NÉLKÜL NINCS VÉDELEM! MINDEZT AZÉRT KELL MEGTENNÜNK, HOGY AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVEKBEN IS EREDMÉNYESEN SZŐLŐT TUDJUNK TERMESZTENI ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN KIVÁLÓ BOROKKAL TUDJUK MEGÖRVENDEZTETNI SAJÁT MAGUNKAT ÉS A BORVIDÉKEKRE LÁTOGATÓ VENDÉGEKET EGYARÁNT.

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2024. 06. 17.