

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2024-07-01

(27. hét)

Fenofázis: fürtzáródás, zsendülés kezdet, zsendülés

A múlt hét eleji csapadékos időt (06.26. 21,2 mm) a hőség váltotta fel, majd az enyhüléssel szeles napok következtek, mely sok esetben a növényvédelmi munkák elvégzését gátolta. A peronoszpóra esetében a lerövidült lappangási idő nyomán az olajfoltok már megjelentek és az esetleges fertőzés esetén a fürttünetek csak jóval később alakulnak ki. Bízom benne, hogy a fürtök kellő képpen ellenállóvá váltak már a peronoszpórával szemben és a fürttünet elmarad (kb. 1 hét múlva kiderül).

Az amerikai szőlőkabóca sajnos nem követi az évjárat hatást ezzel együtt a szőlő fejlettségi állapotát sem. Köszöni szépen jól van. Rossz hír, hogy nem ez volt vagy lesz a záró permetezésünk.

Még kifejlett egyedeket a sárgalapos csapdák nem fogtak. A két rovarölőszeres kezeléssel az ott fejlődő lárváktól ültetvényeinket ki tudtuk „takarítani”, de a berepülő egyedektől nem.

Szakmailag indokoltan ezért a 3 rovarölőszeres célirányosan kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívását követően végezzék el, aminek még nincs itt az ideje!

Badacsonyan a késői érésű és középérésű fajták fürtjei fürtzáródásban vannak. A korai fajták bogyói zsendülés kezdetén vagy már éppen megzsendültek, a kék szőlő fajták színesednek.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 29,6 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek **erős lisztharmat veszélyt** jeleznek.

A bogyók héja kezd elviaszosodni, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Lisztharmat ellen kontakt vagy felszívódó készítményekkel védekezni kell.

25°C felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy még felszívódó készítmények alkalmazásával.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján (jelenleg alacsony) nem szükséges, de a **záródó fajták esetében preventíven indokolt** (ez a későbbiekben igen nagy jelentőséggel bírhat akkor, ha hirtelen nagy mennyiségű csapadékot vesz fel a szőlő).

Feketerothadás ellen preventív védekezés javasolható. Levél- és bogyótünetek megjelentek a borvidéken.

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben. Júliusban a fitoplazma tüneteinek megjelenésére is számítani kell. Ezen tőkét célszerű megjelölni és lehetőleg eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az ESCA-s szőlőtőkét részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.

Figyelem: A héten péntekig marad a mérsékelt meleg 25-27 °C maximum hőmérséklet várható. A szélmozgás gyengülni fog. A hétvégére kánikula várható 30-32 °C maximum hőmérséklettel. Jelentősebb csapadékra a héten már nem kell számítani.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében. A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékelt levelezzenek a fürtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

A hatalmas hajtásnövekmény dunsztot képez a szőlősorokban. Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

A korai és középérésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, melynek most jött el az ideje. Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L₄-L₅-ös lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. A lárvák (L₃-L₄) most érték el a borvidék számos pontján azt a fejlettséget, hogy ellenük célzottan és eredményesen védekezni tudjunk.

A KABÓCÁK ELLENI VÉDELEM KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDELEM NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Törzsültetvény tulajdonosoknak a kifejtett imágók rajzásának megfigyelésére július elejétől kötelezően ki kell helyezniük a sárga- vagy zöldsárga ragacslapokat (3 db csapda/ha).

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2024. 07. 01.