

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2024-07-08

(28. hét)

Fenofázis: zsendülés kezdet, zsendülés, érés

Az elmúlt hetek hektikus időjárását követően egy két helyen megjelentek a feketerothadás és a peronoszpóra fürttünetei is, de egyelőre úgy tűnik, hogy súlyos károk nem alakultak ki.

Peronoszpóra és a lisztharmat is már csak lassan a lombozatot és a másodterméseket tudja megbetegíteni. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a kései- és középérésű fajták, valamint a fiatal telepítések esetében védekezni ellenük nem szükséges.

Az amerikai szőlőkabóca sajnos nem követi az évjárat hatást ezzel együtt a szőlő fejlettségi állapotát sem. Köszöni szépen jól van. Rossz hír, hogy nem ez volt vagy lesz a záró permetezésünk.

Badacsonyan az első kifejlett egyedeket a sárgalapos csapdákból megtaláltuk. A borvidék számos pontján a Kormányhivatal szakemberei már jelentősebb egyedszámot észleltek. A két rovarölőszeres kezeléssel a helyben fejlődő lárváktól ültetvényeinket ki tudtuk „takarítani”, de a berepülő egyedektől nem. Szakmailag indokoltan ezért a 3 rovarölőszeres célirányosan kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívását követően végezzék el, ami hamarosan kiadásra kerül!

Badacsonyan a késői érésű és középérésű fajták fürtjei fürtzáródásban vannak. A korai fajták bogyói megzsendültek, érnek a kék szőlő fajták színesednek.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 0,3 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek **erős lisztharmat veszélyt** jeleznek.

A bogyók héja kezd elviaszosodni, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Lisztharmat ellen kontakt készítményekkel védekezni kell.

25°C felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt készítmények alkalmazásával.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján (jelenleg alacsony) nem szükséges,

Feketerothadás ellen preventív védekezés javasolható. Levél- és bogyótünetek megjelentek a borvidéken.

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben. Júliusban a fitoplazma tüneteinek megjelenésére is számítani kell. Ezen tőkét célszerű megjelölni és lehetőleg eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az ESCA-s szőlőtőkét részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.

Figyelem: A héten hosszabb ideig tartó kánikula várható 32-38 °C maximum hőmérséklettel időnként megélénkülő széllel. Jelentősebb csapadékra a héten sajnos nem kell számítani pedig kellene.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében. A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékelten levelezzenek a fűrtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

A hatalmas hajtásnövekmény dunsztot képez a szőlősorokban. Törekedni kell a mihamarabbi csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

A korai és középérésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Sok fajta megzsundult, érik. Kérek mindenkit, hogy már a kisebb seregély csapatokat is kezdjék el riasztani. A seregélyek még szedren csemegéznek, de ne feledjék, hogy a bodza után a szőlő is sorra fog kerülni az étlapjukon.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, melynek most jött el az ideje. Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca imágóit megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. A lárvák (L₄-L₅) most érték el a borvidék számos pontján azt a fejlettséget, hogy ellenük célzottan és eredményesen védekezni tudjunk.

A KABÓCÁK ELLENI VÉDELEM KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDELEM NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de

amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Törzsültetvény tulajdonosoknak a kifejlett imágók rajzásának megfigyelésére július elejétől kötelezően ki kell helyezniük a sárga- vagy zöldsárga ragacslapokat (3 db csapda/ha).

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2024. 07. 08.