

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2024-07-29

(31. hét)

Fenofázis: érés

Tovább tart a tartós kánikula a tűző napsütés és a csapadék hiánya sokkolta a szőlőt is. Az aszály jeleit mutatják már a tőkék. A napégés nyomai jelentkeznek a leveleken és a fürtökön egyaránt. Az aszályt fokozza még a szárító szél is.

Badacsonyan a szőlők érnek „kényszerérnek”.

A múlt héten Badacsonyan csapadék sajnos csak nyomokban volt, pedig jártam az esőtáncot feszt, de úgy látszik nem eléggé. Aki komolyabban műveli az esőtánc művészetét az kérem csatlakozzon, mert ha így folytatódik, akkor szüretre nem lesz a bogyókban lé. Egy csendes többszöri áztató eső nem ártana, de a továbbiakban a hirtelen nagy mennyiségű eső már kár okozására is képes (bogyórepedés).

Peronoszpóra és a lisztharmat is már csak a lombozatot és a másodterméseket tudja megbetegíteni. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a kései- és középérésű fajták, valamint a fiatal telepítések esetében védekezni ellenük nem szükséges.

A növényvédelmi előrejelző készülékek **erős lisztharmat veszélyt** jeleznek. Lisztharmat ellen kontakt készítményekkel védekezni kell.

25°C felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható, ahol még az élelmezésegészségügyi várakozási idő még belefér a szüretig. Kontakt réztartalmú készítmények alkalmazhatók.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján (jelenleg alacsony) nem szükséges.

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben. Júliusban a fitoplazma tünetei is megjelentek. Ezen tőkéket célszerű megjelölni és lehetőleg eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az ESCA-s szőlőtőkék részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: A héten csütörtökig kánikula várható 30-35 °C maximum hőmérséklettel időnként megélénkülő széllel. „Jelentősebb” csapadékra a héten pénteken és szombaton lehet számítani remélhetőleg csattanó nélkül. Vasárnap 30-32 °C lehet, de jövőhéten a maximum hőmérsékleti értékek várhatóan 30 °C körül alakulnak.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében. A zöldmunkákat nem elhagyva, a

napégést elkerülendő mérsékelten levelezzenek a fürtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

A hatalmas hajtásnövekmény dunsztot képez a szőlősorokban. Törekedni kell a mihamarabbi csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

A permetezési fordulókat tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Akik még virágzáskor nem tették meg és szükséges (AKG stb.) azoknak időszerűvé válik a szüreti levélminták leadása augusztus 31-ig.

Kérem használják ki a borvidékünkön Badacsonyan található akkreditált laboratórium MATE Egyetemi Laborközpont Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Szakterület (87/ 532-209) szolgáltatásait.

Sok fajta megzsundult, érik. Kérek mindenkit, hogy már a kisebb seregély csapatokat is kezdjék el riasztani. A seregélyek még szedren csemegéznek, de ne feledjék, hogy a bodza után a szőlő is sorra fog kerülni az étlapjukon vagy már sorra is került.

A KABÓCÁK ELLENI VÉDELEM KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSGÉGES VÉDELEM NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabóca egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal védekezési II. felhívását!

Szent György-hegy vonatkozásában újabb Kormányhivatali határozat kiadására került sor. Szent György-hegyi települések (Hegymagas, Raposka, Tapolca, Kisapáti) vonatkozásában kötelező érvényű, a borvidéken található többi település részére vonatkozóan megszívlelendő a benne foglaltak.

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Mindenkinek jó egészséget, türelmet és jó szüretet kívánok!

Badacsony, 2024. 07. 29