

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2025-05-12

(20. hét)

Fenofázis: „intenzív” hajtásnövekedés, fűrtmegnyúlás

Jelenleg véget ért a májusi nyár a hajtásnövekedés megtorpant. Az elmúlt hét időjárása a lisztharmat gombának kedvezett a peronoszpóra fertőzéshez szükséges feltételek is teljesültek. Az időjárási előrejelzéseket figyelve úgy tűnik, hogy idén a fagyosszentek nem fogják tiszteletüket tenni a szőlőültetvényekben, az égiek megóvnak tőlük, elkerülnek minket.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyiség összesen 9,4 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek jelenleg **közepes lisztharmat veszélyt** jeleznek. Az elmúlt héten a viszont erős intenzív lisztharmat veszélyt jeleztek. Az elmúlt heti csapadéknak köszönhetően megjelentek az első aszkospórás (primer) fertőzések az idősebb fás részekhez közeli apró levelek fonákán. Nehéz észrevenni, de kérem figyeljék a rózsákat, ők már a múlt héten jeleztek. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt vagy felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Kontakthatású kénkészítmények használata esetén figyelembe kell venni azt, hogy ezek a növényvédő szerek hatékonysága csak 15 C° felett érvényesül.

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával.

(Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenése várható. 10 mm feletti esőt (az elmúlt 2 hétben már teljesültek a fertőzéshez szükséges feltételek) követően a kórképek megjelenésére lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Fel kell készülni virágzástól kezdve a feketerothadás veszélyére is, ha meleg csapadékosra fordulna az időjárás.

Figyelem: A héten marad a változékony hűvös idő 18-20 C°-os maximum hőmérséklet várható. Csütörtöktől szeles napoknak nézünk elébe. Jelentősebb mennyiségű csapadék csütörtök délutántól várható. A hétvégén változékony hűvös, szórványosan csapadékos, szeles időre lehet számítani.

Az elmúlt hetek hűvös időjárása miatt vontatott volt a hajtásnövekedés, mely kedvezett a levél és gubacsatkák felszaporodásának az idősebb és fiatalabb ültetvényekben egyaránt. Ellenük gyérítő jelleggel a nagyobb koncentrációjú kén készítmények is hatásosak lehetnek. Súlyosabb kárkép esetében viszont speciális atkaölő szerek kijuttatása javasolt.

A csapdázott szőlőmolyok (tarka szőlőmoly) mennyisége megugrott, ezért a különböző területeken egyedi számlálás (gazda által) esetén a rovarölő szer hatásmechanizmusát figyelembe véve indokolt lehet a rovarölő szeres kezelés elvégzése.

A szőlő levelein megfigyelhetőek elvétve a kígyóaknás szőlőmoly kárképei is.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Időszerűvé válik a virágzaskori levélminták leadása.

Kérem használják ki a borvidékünkön Badacsonyan található akkreditált laboratórium MATE Központi Vizsgálólaboratórium Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Szakterület (87/ 532-209) szolgáltatásait.

A növényvédelmi fordulók (gyomirtás és lombkezelések), valamint a **zöldmunkák** (hajtásigazítás és kötözés, törzstisztítás) időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L₁-es lárvját megtaláltuk, de jelenleg ellenük védekezni még nem kell.

Kifejezetten a kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, amikor a lárvák eléri az L₂-L₃ lárvastádiumot.

Kérem, kísérvék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közeljövőben megjelenő aktuális védekezési felhívását!

Badacsony, 2025. május 12.