

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2025-06-04

(23. hét)

Fenofázis: virágzás kezdet, virágzás vége, tisztulás

Hirtelen felgyorsultak az események. A hőségnapoknak köszönhetően két nap alatt akkorát nőtek a hajtások, mint két hét alatt összesen. A csapadék is megérkezett, bár jobb lett volna jégmentesen. A keddi zivatart (06.03.) Badacsonyan némi jég is kísérte esővel (12,0 mm), de a tomaji oldalt és Tapolca környékét már súlyosabban érintette a jégeső.

A borvidék szőlőültetvényeiben megtalálható a peronoszpóra olajfoltjai jelzés értékkel csupán, amely korábbi fertőzések eredménye. Lisztharmat tünetek is megtalálhatók levélen, de a látványos vesszőfutása még csak ezután kezdődik. A rendkívüli időjárásnak köszönhető időeltolódást nem csak a szőlő fenológiai állapotában, hanem a kórokozó gombák szaporodási ciklusában is nyomon lehet követni.

Még tőkén belül is heterogén a virágzás menete, valamelyik fürt csak most kezd virágozni, de vannak olyan fürtök, amelyek már tisztulnak.

Összességében Badacsonyan a késői és középérésű fajták virágzás kezdetén a korai fajták virágzás végén vannak.

A múlt héten Badacsonyan mérhető csapadék mennyiség nem volt. Igaz három nap eset eső, de azok csak nyomok voltak. Az elmúlt pár napban harmatosak voltak a reggelek.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt meleg párás időjárásnak köszönhetően **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után újabb tünetek (olajfolt) megjelenésére lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges, de a virágzó fajtáknál preventíven indokolt.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Figyelem: Vasárnapig marad a meleg nyári idő 29-31 °C maximum hőmérséklettel. Vasárnap egy hidegfrontnak köszönhetően szelesnek ígérkezik, záporok, zivatarok alakulhatnak ki az esti óráktól kezdve. A hőmérséklet hirtelen csökkenése mellett 23-25 °C maximum várható, amely a jövőhét közepéig áthúzódik. Jelentősebb csapadék vasárnap és a jövőhét elején hétfőn lehet. Záporok és zivatarok lokálisan főleg a délutáni gomolyfelhőkből bármikor kialakulhatnak.

A vadkár kérdés továbbra is aggasztó. Már nem csak az illatos fajták hajtásait károsítják. Válogatás nélkül akár egy Olasz rizling táblában is nagy károkat tudnak tenni, ha az ültetvény közelébe „befészkeltek” magukat.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás elvégzésére, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvény szinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Időszerű a virágzaskori levélminták és az esedékes talajminták leadása.

Kérem használják ki a borvidékünkön Badacsonyan található akkreditált laboratórium MATE Központi Vizsgálólaboratórium Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Szakterület (87/ 532-209) szolgáltatásait.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, melynek most jön, illetve fog eljönni az ideje. Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L₂-es lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. A lárvák (L₂-L₃) most fogják elérni a borvidék számos pontján azt a fejlettséget, hogy ellenük célzottan és eredményesen védekezni tudjunk.

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közeljövőben megjelenő aktuális védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2025. 06. 04.