

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2025-06-12

(24. hét)

Fenofázis: virágzás vége, tisztulás, zöldbors- zöldborsó nagyság

Hm már ez a Medárd sem a régi. Medárd napján esett eső, de a hosszútávú jótékony hatását sajnos nem élvezhetjük. A szőlő még jól érzi magát, nő mint a veszedelem, de a talaj felsőbb rétegei teljesen kiszáradt. Aszály van és aszályra kell felkészülni főleg az új és fiatal telepítésű szőlőültetvényeknél.

A szőlőnek rendkívül kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően a hajtásnövekedés folyamatos volt. A visszahajló vitorlák már egyes fajták estében átláthatatlan dzsungelt képeznek a sorok között akadályozva a gépi munkák elvégzését, valamint kedvező mikroklímát biztosítanak elsősorban a lisztharmat gomba felszaporodásához. Péter Pál ide vagy oda (június 29), de lassan mérlegelni és meg kell barátkozni a csonkázás elkezdésének gondolatával is.

A borvidéken a késői fajták virágzás végén tisztulásban vannak. A bogyók a melegebb kitettebb helyeken zöld bors- illetve zöldborsó, míg a korai és középérésű fajták bogyói zöldborsó nagyságban.

A múlt héten Badacsonyban leesett csapadék mennyisége összesen 13,0 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt meleg párás időjárásnak köszönhetően **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra veszély jelenleg alacsony preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó vagy kontakt készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék (aminek az előrejelzéseket figyelembe véve az esélye jelenleg csekély) hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenésére és fűrt tünetekre is lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Feketerothadás veszélye alacsony a száraz időjárásnak köszönhetően.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A tavaly fertőzött tőkék már „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. **Most jött el az első „hegy” bejárásnak az ideje!** Az első rovarölőszeres kezelést követően a fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek,

ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A gócpontok felszámolására kb. 10 nap áll rendelkezésre utána a lárvák olyan fejlettségbe kerülnek, hogy a szőlő arany színű sárgaság fitoplazmát terjeszteni képesek.** Az ESCA-s szőlőtőkék részleges amputálásokkal egy pár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Vasárnapig marad a meleg nyári idő 26-30 °C maximum hőmérséklettel. Hétfő egy hidegfrontnak köszönhetően szelesnek ígérkezik, záporok, zivatarok alakulhatnak ki a délutáni óráktól kezdve. A hőmérséklet némi csökkenése mellett 25-28 °C maximum várható, amely a jövőhéten is kitart. „Jelentősebb” csapadék hétfőn lehet. Záporok és zivatarok lokálisan főleg a délutáni gomolyfelhőkből bármikor kialakulhatnak.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

A hatalmas hajtásnövekmény dunsztot képez a szőlősorokban. Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

A zöld- és a júniusi cserebogarak rajzása folyamatos.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, melynek most jött el az ideje. Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L₂-es lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. A lárvák (L₂-L₃) most érték vagy fogják elérni a borvidék számos pontján azt a fejlettséget, hogy ellenük célzottan és eredményesen védekezni tudjunk.

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjüket, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2025. 06. 12.