

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2025-06-26

(26. hét)

Fenofázis: zöldbors- zöldborsó nagyság, fürtzáródás előtt

Múlthéthez képest a hőmérséklet drasztikusan emelkedett. Embert, állatot és növényt próbáló tikkasztó hőség vette kezdetét.

Aszály van és aszályra kell felkészülni főleg az új és fiatal telepítésű szőlőültetvényeknél. Elfogyott a víz. Az idősebb ültetvényekben is már jelentkeznek az aszály jelei. Hő- UV- és szárazság stressz.

A borvidéken a késői fajták zöld bors- illetve zöldborsó nagyságban, a korai és középérésű fajták fürtzáródás előtt, fürtzáródásban vannak.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 0,5 mm volt.

Hétfőn (06.23) 0,2 mm esett Badacsonyan viharos szél kíséretében.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt meleg párás időjárásnak köszönhetően **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra veszély jelenleg alacsony preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó vagy kontakt készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék (csütörtök éjjel és péntek hajnalban várható) hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenésére és fürt tünetekre is lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Feketerothadás veszélye alacsony a száraz időjárásnak köszönhetően.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A tavaly fertőzött tőkék már „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. Megfigyelésem szerint a csonkázás nagymértékben befolyásolja a tünetek megjelenését. Csonkázás után pár nappal a régebben fertőzött tőkéken egyértelműen jelentkeznek a fitoplazma jellegzetes tünetei. **Fel kell készülni a júliusban esedékes második rovarölőszeres kezelésre. A kezelést követően folyamatos „hegy” bejárásokat kell végezni!** A második rovarölőszeres kezelést követően az újabb fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A gócpontok felszámolására lassan elfogy az idő. A lárvák olyan fejlettségbe kerülnek, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmát terjeszteni képesek.** Az ESCA-s szőlőtőkéket részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de **a fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Csütörtökön tetőzik a meleg nem kizárt a 36-37 °C maximum hőmérséklet sem. Csütörtök este péntek hajnalba várható zápor, zivatar viharos szél kíséretében. A csapadék várható mennyisége bizonytalan. Jövő héten tovább emelkedik a hőmérséklet 31-35 °C maximum várható. „Jelentősebb” csapadék a következő héten sajnos nem ígérkezik. Szeles napoknak nézünk elébe.

A növényvédelmi forduló, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

A hatalmas hajtásnövekmény dunsztot képez a szőlősorokban. Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

A zöld- és a júniusi cserebogarak rajzása folyamatos.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, melynek most jött el az ideje. Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L₃-as lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. A lárvák (L₂-L₃) most érték vagy fogják elérni a borvidék számos pontján azt a fejlettséget, hogy ellenük célzottan és eredményesen védekezni tudjunk.

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2025. 06. 26.