

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2025-07-04

(27. hét)

Fenofázis: zöldbors- zöldborsó nagyság, fürtzáródás előtt

Múlthéthez képest a hőmérséklet drasztikusan emelkedett. Embert, állatot és növényt próbáló tikkasztó hőség vette kezdetét. Életmentő volt a múlthéten esett csütörtöki csapadék, aminek a hatása mára már elveszett.

Aszály van és aszályra kell felkészülni főleg az új és fiatal telepítésű szőlőültetvényeknél. Elfogyott a víz. Az idősebb ültetvényekben is már jelentkeznek az aszály jelei. Hő- UV- és szárazság steressz. Napégés főleg az ültetvények lombfalának nyugati oldalán.

A borvidéken a késői fajták zöld bors- illetve zöldborsó nagyságban, a korai és középérésű fajták fürtzáródás előtt, fürtzáródásban vannak. A szőlő csak a jó vízgazdálkodású területeken fejlődött, másutt csak sínylődik. Nagymértékű lombtömeg vesztes tapasztalható, a bogyók fejlődése leállt, zsugorodik.

Tipikus „teve effektus”, onnan vonja el a túléléshez a vizet, ahol még van.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 8,7 mm volt.

Hétfőn (06.23) 0,2 mm esett viharos széllel.

Csütörtökön (06.26) Badacsonyan 8,5 mm esett éjjel zivatar és „villám show” kíséretében. Ugyanekkor 16 mm csapadékot mértek Nemesgulácson.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt meleg időjárásnak köszönhetően **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra veszély jelenleg alacsony preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó vagy kontakt készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék (vasárnaptól kezdődően a jövő hét elején ígérkezik) hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenésére és fürt tünetekre is lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Feketerothadás veszélye jelenleg alacsony a száraz időjárásnak köszönhetően.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A tavaly fertőzött tőkék már „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. Megfigyelésem szerint a csonkázás nagymértékben befolyásolja a tünetek megjelenését. Csonkázás után pár nappal a régebben fertőzött tőkéken egyértelműen jelentkeznek a fitoplazma jellegzetes tünetei. **Eljött a második rovarölőszeres kezelés ideje. A kezelést követően folyamatos „hegy” bejárásokat kell végezni!** A második rovarölőszeres kezelést követően az újabb fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb

eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A gócpontok felszámolására lassan elfogy az idő. A lárvák olyan fejlettségbe kerülnek és kerültek, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmát terjeszteni képesek.** Az ESCA-s szőlőtőkéket részleges amputálásokkal egy pár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Csütörtökön tetőzött a meleg 36-37 °C maximum hőmérséklettel. Csütörtök este egy hidegfrontnak köszönhetően viharos szél kíséretében enyhülés érkezett. Pénteken és szombaton már csak 29-30 °C várható. Vasárnap kissé tovább melegsik az idő 33 °C, de jövő hét elejétől kezdve fokozatosan csökken a hőmérséklet. Keddtől állandósulni látszik a hőmérséklet 21-25 °C várható. Vasárnaptól csapadékosabbra fordul az idő. Nagyobb mennyiségű csapadék vasárnaptól kezdve hétfőn és kedden lehet. A csapadék várható mennyisége bizonytalan. Szeles napoknak nézünk elébe.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre.

A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékelt levelezzenek a fűrtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

A korai és középérésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvény szinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen a második rovarölőszeres kezelésnek most jött el az ideje. Felgyorsultak az események. Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca kifejlett egyedeit (imágókat) megtaláltuk (07.01). A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. A lárvák (L₃-L₅) most érték el a borvidék számos pontján azt a fejlettséget, hogy ellenük még célzottan és eredményesen védekezni tudjunk. Az imágók rajzása elkezdődött. **A két rovarölőszeres kezeléssel a helyben fejlődő lárváktól ültetvényeinket ki tudjuk „takarítani”, de a berepülő egyedektől nem. Szakmailag indokoltan ezért a 3 rovarölőszeres célirányosan a kifejlett kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívását követően végezzék el, ami hamarosan kiadásra kerül!**

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva és kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Törzsültetvény tulajdonosoknak a kifejlett imágók rajzásának megfigyelésére július elejétől kötelezően ki kell helyezniük a sárga- vagy zöldsárga ragacslapokat (3 db csapda/ha).

A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjüket, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2025. 07. 04.