

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2025-07-11

(28. hét)

Fenofázis: fürtzáródás előtt, fürtzáródás, zsendülés kezdet

Megérkezett a várva várt eső! Kizöldült a táj.

A természet fellélegzett, mi is fellélegezhetünk egy kis időre.

A szőlő már nem csak a túlélési, hanem a gyarapodási vízmennyiséget is megkapta azokban az ültetvényekben, ahol az agrotechnikai munkák megfelelőek voltak.

Ez sajnós a tömörödött rossz vízgazdálkodású talajokra nem igaz. Hiába volt áztató eső ezeknél az ültetvényeknél csak a felső pár centi ázott csak át.

A borvidéken a késői fajták fürtzáródás előtt, fürtzáródásban, a korai és középérésű fajták fürtzáródásban zsendülés kezdetén vannak.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 0,5 mm volt.

Azóta a várt csapadék megérkezett. Lehetett volna több is, de igaz ne legyünk telhetetlenek, nagyon kellett.

Badacsonyan a héten eddig 21,7 mm eső esett.

Kisapáti és Nemesgulács környékén ennek a duplája.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a változékony hűvös időjárás ellenére **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. A bogyók héja kezd elviaszosodni, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra veszély jelenleg alacsony preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék (a héten többször volt) hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenésére és fürt tünetekre is lehet még számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján jelenleg (alacsony) nem szükséges (a hét közepén közepes volt), de a záródó fajták esetében preventíven indokolt (ez a későbbiekben igen nagy jelentőséggel bírhat akkor, ha hirtelen nagy mennyiségű csapadékot vesz fel a szőlő).

Feketerothadás veszélye erős és a fertőzések bekövetkezte a nagyobb csapadékoknak köszönhetően nagy volt.

Peronoszpóra lassan már csak a lombozatot tudja megbetegíteni. A lisztharmatnak és a feketerothadásnak sincs már sok ideje hátra ahhoz, hogy a fürtöket fertőzni tudja. 1-2 hét múlva már csak a lombot tudják károsítani, de addig még megtelepedéseket is okozhatnak.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A tavaly fertőzött tőkék már „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. Megfigyelésem szerint a csonkázás nagymértékben befolyásolja a tünetek megjelenését. Csonkázás után pár nappal a régebben fertőzött tőkéken egyértelműen jelentkeznek a fitoplazma jellegzetes tünetei. **Eljött a második rovarölőszeres kezelés ideje. A kezelést követően folyamatos „hegy” bejárásokat kell végezni!** A második rovarölőszeres kezelést követően az újabb fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A gócpontok felszámolására lassan elfogy az idő. A lárvák olyan fejlettségbe kerülnek és kerültek, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmát terjeszteni képesek.** Az ESCA-s szőlőtőkéket részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Pénteken és szombaton még 24-25 °C várható. Vasárnap kissé tovább melegszik az idő 28-29 °C, de jövő hét közepétől csütörtöktől csökken a hőmérséklet. Számottevő mennyiségű csapadék a héten pénteken és szombaton még várható az erőteljes gomolyfelhő képződésnek köszönhetően délután zápor és zivatar kialakulhat. Jövő hét csütörtökön érkezik egy hidegfront, ami ismét hozhat csapadékot magával. Szeles napoknak nézünk elébe, de a szél jövő hét kedden átmenetileg megerősödik.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre.

A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékeltén levelezzenek a fűrtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

Agrotechnika szempontból a talajokat mechanikailag most érdemes zárni a szűkös vízkészlet megőrzése érdekében.

A korai és középerésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen a második rovarölőszeres kezelésnek most jött el az ideje. Felgyorsultak az események. Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca kifejlett egyedeit (imágókat) megtaláltuk (07.01). A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. A lárvák (L₃-L₅) most érték el a borvidék számos pontján azt a

fejlettséget, hogy ellenük még célzottan és eredményesen védekezni tudjunk. Az imágók rajzása elkezdődött. **A két rovarölőszeres kezeléssel a helyben fejlődő lárváktól ültetvényeinket ki tudjuk „takarítani”, de a berepülő egyedektől nem. Szakmailag indokoltan ezért a 3 rovarölőszeres célirányosan a kifejlett kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívását követően végezzék el, ami hamarosan kiadásra kerül!**

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva és kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Törzsültetvény tulajdonosoknak a kifejlett imágók rajzásának megfigyelésére július elejétől kötelezően ki kell helyezniük a sárga- vagy zöldsárga ragacslapokat (3 db csapda/ha).

A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2025. 07. 11.