

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2025-07-18

(29. hét)

Fenofázis: fürtzáródás, zsendülés kezdet, zsendülés, érés

A szőlő fejlődésénél a fenológiai stádiumok előrehaladása felgyorsult köszönhetően elsősorban a szélsőséges változékony időjárásnak és az utóbbi hét csapadéknak.

Ezt szerintem mindenki sejtette, várható volt!

Az érés beindult, aminek természetesen örülünk, de ezzel újabb kihívások keserítik, keseríthetik meg a dolgozók hétköznapijainkat, ha még csak azt. Mire is gondolok a „kórságokon” (vírusok, baktériumok, gombák) kívül a „férgek” (darázs, hangya, muslica) a klasszikus hármas kombó mellett, amik már most kikezdték az érésben lévő bogyókat. Rajtuk kívül az apró- és nagyvadak folyamatos jelenléte, nem beszélve a seregélyről. Mind mind problémát és fejtörést okozhat. No a sokszor szélsőséges, szeszélyes időjárásról nem is beszélve, amit sajnos nagyon nem tudunk változtatni.

A borvidéken a késői fajták fürtzáródásban, a középérésű fajták fürtzáródásban zsendülés kezdetén, zsendülésben míg a korai érésű fajták zsendülés, érés állapotában vannak.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 21,7 mm volt.

A héten további 5,0 mm eső esett. Lehetett volna több is, de ne legyünk telhetetlenek, nagyon kellett.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a változékony időjárás ellenére **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. A bogyók héja kezd elviaszosodni, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt és még felszívódókészítmények alkalmazásával.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján jelenleg (alacsony) nem szükséges (a hét közepén közepes volt), de a záródó fajták esetében preventíven indokolt (ez a későbbiekben igen nagy jelentőséggel bírhat akkor, ha hirtelen nagy mennyiségű csapadékot vesz fel a szőlő).

Feketerothadás veszélye erős és a fertőzések bekövetkezte a többszöri csapadékoknak köszönhetően nagy volt. A fürtökön a gomba fertőző képessége zsendülésig tart.

Preventív védekezés javasolható.

Peronoszpóra lassan már csak a lombot tudja megbetegíteni. A lisztharmatnak és a feketerothadásnak sincs már sok ideje hátra ahhoz, hogy a fürtöket fertőzni tudja. 1-2 hét múlva már csak a lombot tudják károsítani.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A tavaly fertőzött tőkék már „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. Megfigyelésem szerint a csonkázás nagymértékben befolyásolja a tünetek megjelenését. Csonkázás után pár nappal a régebben fertőzött tőkéken egyértelműen jelentkeznek a fitoplazma jellegzetes tünetei. **Eljött a második rovarölőszeres kezelés ideje. A kezelést követően folyamatos „hegy” bejárásokat kell végezni!** A második rovarölőszeres kezelést követően az újabb fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A gócpontok felszámolására lassan elfogy az idő. A lárvák olyan fejlettségbe kerülnek és kerültek, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmát terjeszteni képesek.** Az ESCA-s szőlőtőkéket részleges amputálásokkal egy pár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Pénteken még 24-25 °C várható. Szombaton és vasárnap tovább melegszik az idő 30-31 °C, de jövő hét elején hétfőn tetőzik a hőmérséklet akár 34-35 °C-al. Számottevő mennyiségű csapadék a héten már nem várható. Jövő hét kedden érkezik egy hidegfront, ami ismét ugyan kis eséllyel, de hozhat csapadékot magával. Mérséklődik a szél, de jövő hét kedden átmenetileg megerősödik a berobogó hidegfrontnak köszönhetően. Jövő hét keddtől a következő napokban 28-30 °C lehet. Csütörtök és pénteken még távoli ugyan, de a csapadék kialakulásának valószínűsége megnő.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre.

A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékeltén levelezzenek a fűrtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

Agrotechnika szempontból a talajokat mechanikailag most érdemes zárni a szűkös vízkészlet megőrzése érdekében.

A korai és középérésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Sok fajta megzsundult, érik. Kérek mindenkit, hogy már a kisebb seregély csapatokat is kezdjék el riasztani. A seregélyek még szedren és fűgén csemegéznek, de ne feledjék, hogy a bodza után a szőlő is sorra fog kerülni az étlapjukon.

Aki még nem végezte el valami oknál fogva az amerikai szőlőkabócák elleni kötelező második rovarölőszeres kezelést kérem minél hamarabb tegye meg.

Szőlőtőkéket, ültetvényeket menthet! Felgyorsultak az események. már nem csak Badacsonyan hanem az egész borvidéken megtalálhatjuk az amerikai szőlőkabóca kifejlett egyedeit (imágókat). A tömeges rajzás elindult! A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. „Idősebb” lárvákat (L₄-L₅) még találhatunk az ültetvényekben. Ezek már potenciális fitoplazma terjesztők lehetnek, ha felvették a kórokozót. **A két rovarölőszeres kezeléssel a helyben fejlődő lárváktól ültetvényeinket ki tudtuk „takarítani”, de a berepülő egyedektől nem. Szakmailag indokoltan ezért a 3 rovarölőszeres célirányosan a kifejlett kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívását követően végezzék el, ami hamarosan kiadásra kerül!**

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva és kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Törzsültetvény tulajdonosoknak a kifejlett imágók rajzásának megfigyelésére július elejétől kötelezően ki kell helyezniük a sárga- vagy zöldsárga ragacslapokat (3 db csapda/ha).

A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjüket, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2025. 07. 18.