

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2025-07-18

(31. hét)

Fenofázis: zsendülés kezdet, zsendülés, érés

A szőlő fejlődésénél a fenológiai stádiumok előrehaladása felgyorsult köszönhetően elsősorban a szélsőséges változékony időjárásnak és az utóbbi hét csapadéknak. Az érés beindult!

A 3. rovarölőszeres célirányosan a kifejlett kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívása szerint végezzék el, ami kiadásra került!

Sorsfordító idők jönnek!

Minden túlzás nélkül szőlőültetvények és a Borvidék sorsa a tét!

Ezt mérlegelve minden szőlő és kert tulajdonost, akinek csak 1 szőlőtőkéje is van arra kérek megfontoltan, okszerűen és célzottan végezzék el a rovarölő szeres permetezést. Nagy mértékben csökkenhet ezáltal az amerikai szőlőkabóca populáció, ami megbetegítheti a tőkéket.

A borvidéken a késői fajták fűrtzáródásban zsendülés kezdetén, a középérésű fajták zsendülésben, míg a korai érésű fajták zsendülés, érés állapotában vannak.

A 30. héten 5,0 mm eső esett.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 40,3 mm volt. Kisapáti és Nemesgulács környékén viszont „csak” 20 mm csapadék esett.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a változékony időjárás ellenére **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. A bogyók héja kezd elviaszosodni, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Mindezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt készítmények alkalmazásával.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján jelenleg (alacsony) nem szükséges.

Feketerothadás veszélye erős és a fertőzések bekövetkezte a többszöri csapadékoknak köszönhetően nagy volt. A zsendülés előtt álló fajták esetében preventív védekezés javasolható.

Peronoszpóra már csak a lombot tudja megbetegíteni. A lisztharmatnak és a feketerothadásnak sincs már sok ideje hátra ahhoz, hogy a fürtöket fertőzni tudja. 1-2 hét múlva már csak a lombot tudják károsítani.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A fertőzött tőkék folyamatosan „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. Megfigyelésem szerint a csonkázás nagymértékben befolyásolja a tünetek megjelenését. Csonkázás után pár nappal a régebben fertőzött tőkéken egyértelműen jelentkeznek a fitoplazma jellegzetes tünetei. **Eljött a harmadik rovarölőszeres kezelés ideje. A kezelést követően folyamatos „hegy” bejárásokat kell végezni!** A harmadik rovarölőszeres kezelést követően az újabb fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A lárvák olyan fejlettségbe kerültek, hogy a szőlő arany színű sárgaság fitoplazmát terjeszteni képesek.** Az ESCA-s szőlőtőkéket részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Szombatig még 25-28 °C várható. Vasárnap az előrejelzések alapján egy újabb hidegfront érkezik. Vasárnaptól jövő hét közepéig 24-26 °C, ígérkezik. Számottevő mennyiségű csapadék a héten hétvégén és jövő hét első felében várható. Mérséklődik a szél, de a hétvégén és jövő hét elején újra megerősödik.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Törekedni kell a mihamarabbi csonkázás és gyomirtás elvégzésre.

A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékeltén levelezzenek a fűrtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

Agrotechnika szempontból a talajokat mechanikailag most érdemes zárni a szűkös vízkészlet megőrzése érdekében.

A korai és középérésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Sok fajta megzsundult, érik. Kérek mindenkit, hogy már a kisebb seregély csapatokat is kezdjék el riasztani. A seregélyek még szedren és fűgén csemegéznek, de ne feledjék, hogy a bodza után a szőlő is sorra fog kerülni az étlapjukon.

Felgyorsultak az események. Már nem csak Badacsonyban hanem az egész borvidéken megtalálhatjuk az amerikai szőlőkabóca kifejlett egyedeit (imágókat). **A tömeges rajzás elindult!** A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. „Idősebb” lárvákat (L₄-L₅) még találhatunk az ültetvényekben. Ezek már potenciális fitoplazma terjesztők lehetnek, ha felvették a kórokozót.

Szakmailag indokoltan és kötelezően, ezért a 3. rovarölőszeres célirányosan a kifejlett kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívását követően végezzék el, ami kiadásra került!

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva és kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Törzsültetvény tulajdonosoknak a kifejlett imágók rajzásának megfigyelésére július elejétől kötelezően ki kell helyezniük a sárga- vagy zöldsárga ragacslapokat (3 db csapda/ha).

A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

Kérem, kísérik figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal II. védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjűk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2025. 07. 30.