

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2025-08-08

(32. hét)

Fenofázis: érés

Az érés beindult!

„Érik a szőlő hajlik a vessző.....”, de meddig? „Ez itt a kérdés”....

Csak rajtunk szőlősgazdákon múlik.

A 3. rovarölőszeres célirányosan a kifejlett kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívása szerint végezzék el, ami kiadásra került!

Sorsfordító idők jönnek!

Minden túlzás nélkül szőlőültetvények és a Borvidék sorsa a tét!

A szőlő jövője az amerikai szőlőkabóca elleni sikeres védekezésen múlik vagy bukik. Ez az a helyzet amikor már az ima sem segít.

Kegyszerek helyett vegyszereket „mérget” (rovarölő szert) kell permetezni!

Ezt mérlegelve arra kérek minden szőlő és kert tulajdonost, akinek csak 1 szőlőtőkéje is van megfontoltan, okszerűen és célzottan végezzék el a rovarölő szeres permetezést. Nagy mértékben csökkenhet ezáltal az amerikai szőlőkabóca populáció, ami megbetegítheti a tőkékét.

A borvidéken a késői és a középérésű fajták érnek, míg a korai érésű fajták érnek szüret közeli állapotában vannak.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 25,0 mm volt. Szinte minden napra jutott csapadék. Jelentős csapadék 08.02.-án esett 20,5 mm.

A növényvédelmi előrejelző készülékek **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. A bogyók héja elviaszosodott, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Mindezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra esetében már csak preventív (megelőző) védekezés javasolható a késői érésű fajtáknál kontakt készítmények alkalmazásával.

(Mi a késői érésű fajta? Több, mint valószínű idén is a szőlőfajták zöme egybeérik.)

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján jelenleg (alacsony) nem szükséges.

Peronoszpóra és a lisztharmat is már csak a lombozatot és a másodterméseket tudja megbetegíteni. Az egészséges fürtök már ellenállóak e két kórokozóval szemben.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A fertőzött tőkék folyamatosan „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. Megfigyelésem szerint a csonkázás nagymértékben befolyásolja a tünetek megjelenését. Csonkázás után pár nappal a régebben fertőzött tőkéken egyértelműen jelentkeznek a fitoplazma jellegzetes tünetei. **Eljött a harmadik rovarölőszeres kezelés ideje. A kezelést követően folyamatos „hegy” bejárásokat kell végezni!** A harmadik rovarölőszeres kezelést követően az újabb fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A lárvák olyan fejlettségbe kerültek, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmát terjesztetni képesek.** Az ESCA-s szőlőtőkéket részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Vasárnapig 31-35 °C várható. Hétfőn az előrejelzések alapján némi torpanás 29 °C lehet, de utána jövő hét csütörtökig fokozódik a hőség 30-36 °C, ígérkezik. Számottevő mennyiségű csapadék a hét hátralévő időszakában és a jövő héten sem várható. Mérséklődik a szél, de vasárnap és hétfőn újra megélénkülhet. Az éjszakai hőmérsékletek 18-20 °C körül alakulnak.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Törekedni kell a mihamarabbi csonkázás és gyomirtás elvégzésre.

A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékeltén levelezzenek a fűrtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

Agrotechnika szempontból a talajokat mechanikailag most érdemes zárni a szűkös vízkészlet megőrzése érdekében.

A korai és középérésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Akik még virágzáskor nem tették meg és szükséges (AKG stb.) azoknak időszerűvé válik a szüreti levélminták leadása augusztus 31-ig.

Kérem használják ki a borvidékünkön Badacsonyan található akkreditált laboratórium MATE Központi Vizsgálólaboratórium Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Szakterület (87/ 532-209) szolgáltatásait.

Sok fajta megzsundult, érik. Kérek mindenkit, hogy már a kisebb seregély csapatokat is kezdjék el riasztani. A seregélyek még szedren és fűgén csemegéznek, de ne feledjék, hogy a bodza után a szőlő is sorra fog kerülni az étlapjukon.

Az amerikai szőlőkabóca tömeges rajzás elkezdődött! A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét még megfigyelhetjük a lárvákon kívül. „Idősebb” lárvákat (L4-L5) még találhatunk az ültetvényekben. Ezek már potenciális fitoplazma terjesztők lehetnek, ha felvették a kórokozót.

Szakmailag indokoltan és kötelezően, ezért a 3. rovarölőszeres célirányosan a kifejlett kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívását követően végezzék el, ami kiadásra került!

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseim szerint nagyobb számú kabócalárva és kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Törzstulajdonosoknak a kifejlett imágók rajzásának megfigyelésére július elejétől kötelezően ki kell helyezniük a sárga- vagy zöldsárga ragacslapokat (3 db csapda/ha).

A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCΣ VÉDELEM!

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal II. védekezési felhívását!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjék kereskedőjük, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Szüret után indokolt lehet záró permetezésként, még lombos állapotban egy réz + kén tartalmú szerek kijuttatása is az áttelelő szaporítóképletek gyérítése végett, valamint szakmailag indokolt és ha szükséges a sárgalapos megfigyelésekre alapozott védekezési küszöbértéket meghaladó amerikai szőlőkabóca fogás esetén (4 imágó/10 nap) még egy rovarölő szeres kezelés is.

Idei év zárásaként:

Gárdonyi Géza: A bor legendája

Szólt az Isten: “Kedves fiam, Nőé:

Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?”

Felelt Nőé: “No, megöregedtem,
de ilyen jó bogyót még nem ettem.”

Szól az Isten: “Kedves fiam, Nőé:

A csípős must, hadd lássuk, hogy jó-é?”

Felelt Nőé: “Ihaj, csuhaj! Sári!

Három Istent kezdek immár látni!”

Szólt az Isten: “Kedves fiam, Nőé:

Hát az ó-bor, hadd lássuk, hogy jó-é?”

Felelt Nőé: “Iszom reggel óta:

Gyere pajtás, van még a hordóba !”

Hiszek és bízom benne, hogy a szőlőtermesztésnek és borkészítésnek nem csak múltja és jelene, hanem hosszútávon jövője is lesz, amíg világ a világ!

Mindenkinek jó egészséget, türelmet, kitartást és jó szüretet kívánok!

Badacsony, 2025. 08. 08.