

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2026-05-19

(21. hét)

Fenofázis: „intenzív” hajtásnövekedés, fürtmegnyúlás

Májusi eső aranyat ér! Az áprilisra kialakult aszályos periódust követően végre megérkezett a várva várt csapadék.

Ennek köszönhetően a kórokozó gombák is aktivizálták magukat.

Az elmúlt hét változékony hűvösebb időjárásnak köszönhetően a hajtásnövekedés vontatottá vált. A hajtások mérete egy tőkén belül is igen heterogén képet mutat. Az elmúlt heti csapadéknak köszönhetően megjelentek a lisztharmat első aszkospórás (primer) fertőzései az idősebb fás részekhez közeli apró levelek fonákán. Nehéz észrevenni, de kérem figyeljék a rózsákat, ők már május elején jelezték a lehetséges fertőzések bekövetkezésének idejét.

Az utóbbi hetek időjárásában a szélé volt a főszerep. Ha kellett, ha nem szinte mindig fújt. Minden esetre lopva, késések és csúszások közepette azért elvégezhetette vagy most már elvégezheti mindenki a növényvédelmi munkákat. Akik a nagy esőzés előtt elvégezték az első kezelést azoknak meg kell ismételni a kezelést, mivel annak a tartamhatás már nem érvényesül.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyiség összesen 54 mm volt, szinten minden napra jutott több kevesebb csapadék.

A növényvédelmi előrejelző készülékek jelenleg **közepes lisztharmat veszélyt** jeleznek. A múlt heti csapadék mennyisége viszont elegendő volt újabb fertőzések kialakulásához. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt vagy felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Kontakthatású kénkészítmények használata esetén figyelembe kell venni azt, hogy ezek a növényvédő szerek hatékonysága csak 15 C° felett érvényesül.

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy felszívódó készítmények alkalmazásával.

(Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenése várható.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Fel kell készülni virágzástól kezdve a feketerothadás veszélyére is, ha meleg csapadékosra fordulna az időjárás.

Az elmúlt hetek hűvös időjárása miatt vontatott volt a hajtásnövekedés, mely kedvezett a levél és gubacsatkák felszaporodásának az idősebb és fiatalabb ültetvényekben egyaránt. Ellenük gyérítő jelleggel a nagyobb koncentrációjú kén készítmények is hatásosak lehetnek. Súlyosabb kárkép esetében viszont speciális atkaölő szerek kijuttatása javasolt.

A csapdázott szőlőmolyok (tarka szőlőmoly) mennyisége Badacsonyban elenyésző volt, ezért ellenük célzottan rovarölő szerek kezelése nem indokolt.

A vadkár kérdés továbbra is aggasztó. Már nem csak az illatos fajták hajtásait károsítják. Válogatás nélkül akár egy Olasz rizling táblában is nagy károkat tudnak tenni, ha az ültetvény közelébe „befészkeltek” magukat. Az őzek ellési szezonja elindult. Kérem kellő körültekintéssel végezzék a soraljművelést. Óvják és ne nyúljanak a megbújtatott gidákhoz.

Figyelem: A héten lassú felmelegedés mellett 22-25 C°-os maximum hőmérséklet várható. Csapadék a héten már nem ígérkezik. Csütörtökön átmenetileg megerősödik a szél.

A növényvédelmi fordulók (gyomirtás és lombkezelések), valamint a **zöldmunkák** (hajtásigazítás és kötözés, törzstisztítás) időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvénytípusonként lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Badacsonyban az amerikai szőlőkabóca L₁-es lárváját megtaláltuk tömeges lárvakelés a hét második felétől jövőhéten várható, de jelenleg ellenük védekezni még nem kell!!!

A törzstisztítás elvégzésével nagy mértékben csökkenthetjük a kikelt lárvák egyedszámát. A fiatal L₁-es lárvák igen érzékenyek, a talaj közelében lévő törzshajtásokon érzi igazán jól magát. A törzshajtások eltávolításával kedvezőtlen életteret tudunk kialakítani számára.

Kifejezetten a kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, amikor a lárvák zöme eléri az L₂ lárvastádiumot, de már megjelentek az L₃-as lárvák is.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közeljövőben megjelenő aktuális védekezési felhívását!

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjüket, növényvédelmi szakirányítójukat segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2026. május 19.