

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2026-05-26

(22. hét)

Fenofázis: intenzív hajtásnövekedés, fürtmegnyúlás, virágzás kezdet

Hirtelen felgyorsultak az események. A tavalyi évhez hasonlóan bekövetkezett hőségnek köszönhetően két nap alatt akkorát nőtek a hajtások, mint két hét alatt összesen.

Lisztharmat tünetek megtalálhatók levélen, de a látványos vesszőfutása még csak ezután kezdődik. A rendkívüli időjárásnak köszönhető időeltolódást nem csak a szőlő fenológiai állapotában, hanem a csapadékos időnek köszönhetően a kórokozó gombák szaporodási ciklusában is nyomon lehet követni.

Badacsonyan a korai és középérésű fajták virágzása elkezdődött.

A múlt héten Badacsonyan mérhető csapadék mennyiség nem volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt meleg párás időjárásnak köszönhetően **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után olajfoltok megjelenésére lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges, de a virágzó fajtáknál preventíven indokolt.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Figyelem: A hét közepén tetőzik a hőség szerdán 30-31 C°-os maximum hőmérséklet várható. A hét második felében mérséklődik a meleg 24-28 C°-os maximum hőmérséklet lehet. Számottevő csapadék délutáni órákban kialakuló lokális záporok és zivatarok formájában szerdán és vasárnap ígérkezik.

A vadkár kérdés továbbra is aggasztó. Már nem csak az illatos fajták hajtásait károsítják. Válogatás nélkül akár egy Olasz rizling táblában is nagy károkat tudnak tenni, ha az ültetvény közelébe „befészkelték” magukat. Az őzek ellési szezonja elindult. Kérem kellő körültekintéssel végezzék a soraljművelést. Óvják és ne nyúljanak a megbújtatott gidákhoz.

A növényvédelmi fordulók (gyomirtás és lombkezelések), valamint a **zöldmunkák** (hajtásigazítás és kötözés, törzstisztítás) időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L1-es lárváját megtaláltuk tömeges lárvakezelés a héten várható, de jelenleg ellenük védekezni még nem kell!!!

A törzstisztítás elvégzésével nagy mértékben csökkenthetjük a kikelt lárvák egyedszámát. A fiatal L1-es lárva igen érzékeny, a talaj közelében lévő törzshajtásokon érzi igazán jól magát. A törzshajtások eltávolításával kedvezőtlen életteret tudunk kialakítani számára.

Kifejezetten a kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, amikor a lárvák zöme eléri az L2 lárvastádiumot, de már megjelentek az L3-as lárvák is.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal közeljövőben megjelenő aktuális védekezési felhívását!

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjűk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2026. május 26.