

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2026-06-03

(23. hét)

Fenofázis: virágzás kezdet, virágzás vége, tisztulás

Hirtelen felgyorsultak az események. A hőségnapoknak köszönhetően két nap alatt akkorát nőtek a hajtások, mint két hét alatt összesen. A csapadék is megérkezett, bár jobb lett volna jégmentesen. A szerdai zivatart lánc (05.27.) Badacsonyban jég nélkül eset (2,1 mm), de a tomaji oldalt és Tapolca környékét már jégeső is érintette. Heterogén volt a csapadékeloszlás lokálisan a borvidék számos pontján esett jelentős mennyiségű eső.

Még tőkén belül is heterogén a virágzás menete, valamelyik fürt csak most kezd virágozni, de vannak olyan fürtök, amelyek már tisztulnak.

Összességében Badacsonyban a késői és középérésű fajták virágzás kezdetén a korai fajták virágzás végén vannak.

A múlt héten Badacsonyban leesett csapadék mennyiség összesen 4,2 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt meleg párás időjárásnak köszönhetően **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után újabb tünetek (olajfolt) megjelenésére lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni az előrejelző készülékek jelzése alapján **a virágzó fajtáknál indokolt. Magas a fertőzési nyomás.**

Feketerothadás veszélye magas a csapadékos párás és melegedő időjárásnak köszönhetően.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Figyelem: Szerdán átmenetileg a csapadékos időnek köszönhetően a hőmérséklet csökken 20-23 °C maximum várható, ezt követően a hét második felében hőmérséklet emelkedik 25-27 °C maximum lehet. Pénteken átmenetileg megerősödik a szél. Jelentősebb csapadéokra szerdán, pénteken és vasárnap lehet számítani. Záporok és zivatarok lokálisan főleg a délutáni gomolyfelhőkből bármikor kialakulhatnak.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás elvégzésére, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvény szinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen szőlő virágzásban vagy közvetlen virágzás után kell védekezni, melynek most fog eljönni az ideje (június 10-18). Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L2-es lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. **Kifejezetten a kabócák ellen szőlő virágzásban vagy közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, amikor a lárvák zöme eléri az L2 lárvastádiumot, de már megjelentek az L3-as lárvák is.**

A törzstisztítás elvégzésével nagy mértékben csökkenthetjük a kikelt lárvák egyedszámát, valamint a kijuttatandó rovarölő szerek hatékonyságát. A fiatal L1-es lárvák igen érzékenyek, a talaj közelében lévő törzshajtásokon érzik igazán jól magát. A törzshajtások eltávolításával kedvezőtlen életteret tudunk kialakítani számára.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal megjelent aktuális védekezési felhívását!

A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCSEN VÉDELEM! MINDEZT AZÉRT KELL MEGTENNÜNK, HOGY AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVEKBEN IS EREDMÉNYESEN SZŐLŐT TUDJUNK TERMESZTENI ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN KIVÁLÓ BOROKKAL TUDJUK MEGÖRVENDEZTETNI SAJÁT MAGUNKAT ÉS A BORVIDÉKRE LÁTOGATÓ VENDÉGEKET EGYARÁNT.

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseink szerint nagyobb számú kabócalárva és majd a későbbiek során kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjüket, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2026. 06. 03.