

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2026-06-09

(24. hét)

Fenofázis: virágzás vége, tisztulás, zöldbors- zöldborsó nagyság

Arra kell ocsúdnunk, hogy a szőlőfajták többsége hirtelen elvirágzott, tisztul.

A szőlő jól érzi magát nő, mint a veszedelem.

A szőlőnek rendkívül kedvező időjárási körülményeknek köszönhetően a hajtásnövekedés folyamatos volt. A visszahajló vitorlák már egyes fajták estében átláthatatlan dzsungelt képeznek a sorok között akadályozva a gépi munkák elvégzését, valamint kedvező mikroklímát biztosítanak elsősorban a lisztharmat gomba felszaporodásához. Péter Pál ide vagy oda (június 29), lassan mérlegelni és meg kell barátkozni a csonkázás elkezdésének gondolatával is.

A borvidéken a késői fajták virágzás végén tisztulásban vannak. A bogyók a melegebb kitettebb helyeken zöld bors- illetve zöldborsó, míg a korai és középérésű fajták bogyói zöldborsó nagyságban.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 13,5 mm volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt meleg párás időjárásnak köszönhetően **erős tartós lisztharmat veszélyt** jeleznek. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra veszély jelenleg alacsony preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó vagy kontakt készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék (az előrejelzések alapján a következő napokban várható) hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenésére és fűrt tünetekre is lehet számítani.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges, de a még virágzó fajták esetében indokolt.

Feketerothadás veszélye jelenleg alacsony, de a következő napok várható csapadékosabb időjárásának köszönhetően emelkedik.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A tavaly fertőzött tőkék már „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. **Most jött el az első „hegy” bejárásnak az ideje!** Az első rovarölőszeres kezelést követően a fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A gócpontok felszámolására kb. 10**

nap áll rendelkezésre utána a lárvák olyan fejlettségbe kerülnek, hogy a szőlő aranszínű sárgaság fitoplazmát terjeszteni képesek. Az ESCA-s szőlőtőkék részleges amputálásokkal egy pár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincs gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Hallgat az idő! Kedden még nyári idő várható 28-29 °C maximum hőmérséklettel, majd ezt követően a hét második felére mérséklődik a felmelegedés csüttőrkön hűvös szeles idő várható 19 °C maximum hőmérséklettel. Hét végére a 23-25 °C maximum hőmérséklet ígérkezik. Kedd délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. megélénkítő viharos szél kíséretében. „Jelentősebb” csapadék péntek kivételével minden nap lehet. Záporok és zivatarok főleg a délutáni esti órákban bármikor kialakulhatnak.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

A hatalmas hajtásnövekmény dunsztot képez a szőlősorokban. Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

A zöld- és a júniusi cserebogarak rajzása folyamatos.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen szőlő virágzásban vagy közvetlen virágzás után kell védekezni, melynek most jön el az ideje (június 10-18). Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L3-as lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. **Kifejezetten a kabócák ellen szőlő virágzásban vagy közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, amikor a lárvák zöme eléri az L2 lárvastádiumot, de már megjelentek az L3-as lárvák is.**

A törzstisztítás elvégzésével nagy mértékben csökkenthetjük a kikelt lárvák egyedszámát, valamint a kijuttatandó rovarölő szerek hatékonyságát. A fiatal L1-es lárva igen érzékeny, a talaj közelében lévő törzshajtásokon érzi igazán jól magát. A törzshajtások eltávolításával kedvezőtlen életteret tudunk kialakítani számára.

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseink szerint nagyobb számú kabócalárva és majd a későbbiek során kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

**Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei
Kormányhivatal megjelent 2026/I. védekezési felhívását!**

A benne foglaltak minden szőlőtulajdonos számára kötelező!

**A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM
KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINC S VÉDELEM!**

**Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi
szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint
segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.**

Badacsony, 2026. 06. 09.