

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2026-06-23

(26. hét)

Fenofázis: zöldbors- zöldborsó nagyság, fürtzáródás kezdet, fürtzáródás

Múlthéthez képest a hőmérséklet drasztikusan emelkedett. Embert, állatot és növényt próbáló tikkasztó hőség vette kezdetét.

Aszály van és aszályra kell felkészülni főleg az új és fiatal telepítésű szőlőültetvényeknél. Elfogyott a víz. Az idősebb ültetvényekben is már jelentkeznek az aszály jelei. Hő- UV- és szárazság stressz.

Fel van adva a lecke.

A borvidéken a késői fajták zöld bors- illetve zöldborsó nagyságban, a korai és középérésű fajták fürtzáródás előtt, fürtzáródásban vannak.

A múlt héten Badacsonyan mérhető csapadék nem volt. Háromszor esett csapadék nyom. Kedden beködött a táj. A páratartalom 100% volt.

A növényvédelmi előrejelző készülékek a fülledt meleg időjárásnak köszönhetően **közepes lisztharmat veszélyt** jeleznek. A „sivatagi” forró körülmények (magas hőmérséklet, alacsony relatív páratartalom) a légköri aszály nem kedvez a kórokozónak sem. A gombák aktivitását is csökkenti. A bogyók héja kezd elviaszosodni, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra veszély jelenleg alacsony preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék (az előrejelzések alapján a következő napokban) sajnos nem várható.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Feketerothadás veszélye alacsony a száraz időjárásnak köszönhetően.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A tavaly fertőzött tőkék már „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. **Most jött el az első „hegy” bejárásnak az ideje!** Az első rovarölőszeres kezelést követően a fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A gócpontok felszámolására kb. 10 nap áll rendelkezésre utána a lárvák olyan fejlettségbe kerülnek, hogy a szőlő**

aranyszínű sárgaság fitoplazmát terjeszteni képesek. Az ESCA-s szőlőtőkékét részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség.**

Figyelem: Napról napra melegszik az idő. Csütörtökig még 33- 34 °C maximum hőmérséklet, majd ezt követően pénteken 34-35 °C, hét végére 36-39 °C maximum hőmérséklet várható. Az ország fölé húzódó hőkupolával forró napok és trópusi éjszakák lesznek. Tikkasztó nyár veszi kezdetét és ezzel a hőhullámmal a hőségnapok száma is gyarapodni fog. Az időjárási előrejelzések alapján a mostani számítások szerint „jelentősebb” csapadék és mérséklődő meleg jövőhét szerdától várható.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

A hatalmas hajtásnövekmény dunsztot képez a szőlősorokban. Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

Az ültetvényekben megjelent és fokozottan jelentkeznek a tápanyaghiány tünetei (vashiány (sárgulás), cink hiány, bór hiány stb.). Megelőzésre és „gyógyításra” levélvizsgálati eredményekre alapozva egyedi talajkezelés vagy ültetvényszinten lombkezelés (levéltrágya) javasolható.

A zöld cserebogarak rajzása lecsengett.

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák ellen szőlő virágzásban vagy közvetlen virágzás után kell védekezni, melynek most jött el az ideje. Az első kötelező védekezést követően a védekezési felhívást figyelembe véve a második kötelező kifejezetten amerikai szőlőkabóca elleni védekezés is időszerűvé válik (július 1- július 7). Badacsonyan az amerikai szőlőkabóca L3-as lárváját megtaláltuk. A levelek fonákán a lárvabőrök jelenlétét is megfigyelhetjük a lárvákon kívül. **Kifejezetten a kabócák ellen akkor kell védekezni, amikor a lárvák zöme eléri az L2 lárvastádiumot, de már megjelentek az L3-as lárvák is.**

Az elhúzódozó lárvakelést jól jelzi, hogy még mindig vannak L1-es lárvák. Törzstisztítás elvégzésével nagy mértékben csökkenthetjük a kikelt lárvák egyedszámát, valamint a kijuttatandó rovarölő szerek hatékonyságát. A fiatal L1-es lárvák igen érzékenyek, a talaj közelében lévő törzshajtásokon érzi igazán jól magát. A törzshajtások eltávolításával kedvezőtlen életteret tudunk kialakítani számára.

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseink szerint nagyobb számú kabócalárva és majd a későbbiek során kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

**Kérem, kísérik figyelemmel a Veszprém Vármegyei
Kormányhivatal megjelent 2026/I. védekezési felhívását!**

A benne foglaltak minden szőlőtulajdonos számára kötelező!

**A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM
KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!**

**Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi
szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint
segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.**

Badacsony, 2026. 06. 23.