

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2026-07-22

(30. hét)

Fenofázis: fürtzáródás, zsendülés kezdet, zsendülés

Múlt héten csütörtökön megérkezett a felfrissülés és a várva várt eső is! Mennyiségileg sajnos elmaradt a vártnál. 3,3 mm eső esett Badacsonyan, de a borvidék több pontján „nagyobb” mennyiséget is lehetett mérni. Minden cseppnek örülni kell.

Továbbra is aszály sújtja a vidéket.

A múlt héten Badacsonyan leesett csapadék mennyisége összesen 4,2 mm volt.

A borvidéken a késői fajták fürtzáródásban a korai és középérésű fajták fürtzáródás végén zsendülésben vannak. Egyes korai fajták érnek, kényszerérnek.

A növényvédelmi előrejelző készülékek **erős lisztharmat veszélyt** jeleznek. A bogyók héja kezd elviaszosodni, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt és felszívódó készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra veszély jelenleg alacsony. Preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával. Nagyobb mennyiségű csapadék az előrejelzések alapján a hétvégén várható.

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges, de a záródó fajták esetében preventíven indokolt.

Feketerothadás veszélye alacsony a száraz időjárásnak köszönhetően, de csapadék függvényében ez is erősödni fog. A zsendülés előtt álló fajták esetében preventív védekezés javasolható.

Peronoszpóra lassan már csak a lombozatot tudja megbetegíteni. A lisztharmatnak és a feketeterothadásnak sincs már sok ideje hátra ahhoz, hogy a fürtöket fertőzni tudja. 1-2 hét múlva már csak a lombot tudják károsítani.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A tavaly fertőzött tőkék már „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. **Most jött el a „hegy” bejárásoknak az ideje!** A második rovarölőszeres kezelést követően a fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az

ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az amerikai szőlőkabóca (L₁-L₂) lárvája még nem fertőz, de a további lárvastádiumok már fertőzni képesek, ha egy beteg tőkéből felvették a kórokozót. **A gócpontokat mihamarabb fel kell számolnia mert már az idősebb lárvák olyan fejlettségbe kerültek, hogy a szőlő arany színű sárgaság fitoplazmát terjesztetni már képesek.** Az ESCA-s szőlőtőkét részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség!**

Figyelem: Csütörtökön egy újabb hidegfront várható. A hét második felében 26- 30 °C maximum hőmérsékletekre lehet számítani. Széllel párosuló hidegfrontok határozzák meg az időjárást. Az időjárási előrejelzések alapján a mostani számítások szerint „jelentősebb” csapadék csütörtökön és vasárnap várható. Ettől függetlenül a légkör és az előrejelzések bizonytalanok, lokálisan bármikor főleg a délutáni órákban kialakulhat zápor zivatar is. A hosszabb távú előrejelzések alapján jövőhét elején még változékony idő várható, de utána ismét a tartós hőségre lehet számítani.

A növényvédelmi fordulók, valamint a **zöldmunkák** időbeni elvégzése szükséges a **megfelelő preventív védelem** elérése érdekében.

Törekedni kell a mihamarabbi hajtásigazítás és a csonkázás elvégzésre, természetesen a gyomirtásról se feledkezzenek el.

A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékelten levelezzenek a fűrtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

A korai és középérésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák szempontjából felgyorsultak az események. már nem csak Badacsonyan hanem az egész borvidéken megtalálhatjuk az amerikai szőlőkabóca kifejlett egyedeit (imágókat). A tömeges rajzás elindult! Az ültetvényekben még mindig található vegyes összetételű idősebb lárvák. **Folyamatos törzstisztításra van szükség.**

A két rovarölőszeres kezeléssel a helyben fejlődő lárváktól ültetvényeinket ki tudtuk „takarítani”, de a berepülő egyedektől nem. Szakmailag indokoltan ezért a 3. rovarölőszeres célirányosan a kifejlett kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívását követően végezzék el, ami hamarosan kiadásra kerül!

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseink szerint nagyobb számú kabócalárva és majd a későbbiek során kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

**A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM
KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!**

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2026. 07. 22.