

Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács

Növényvédelmi előrejelzés

2026-08-05

(32. hét)

Fenofázis: zsendülés kezdet, zsendülés, érés (kényszerérés)

31. héten mérhető csapadék nem esett.

Továbbra is aszály sújtja a vidéket.

Drámai a helyzet.

Elfogyott a víz!

Minden és mindenki is a vízért és a túlélésért harcol.

A seregély és a vadak is ezt teszik.

A szőlő alig zsendült meg, érik és kényszer érik, védhetetlenül már jelentős vad- és seregélykár érte a szőlőültetvényeket.

A 3. rovarölőszeres célirányosan a kifejlett kabócák elleni védekezést (08.03-08.12) a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívása szerint végezzék el, ami kiadásra került!

A szőlő jövője az amerikai szőlőkabóca elleni sikeres védekezésen múlik vagy bukik. Ez az a helyzet amikor már az ima sem segít.

Kegyszerek helyett vegyszereket „mérget” (rovarölő szert) kell permetezni!

Ezt mérlegelve arra kérek minden szőlő és kert tulajdonost, akinek csak 1 szőlőtőkéje is van megfontoltan, okszerűen és célzottan végezzék el a rovarölőszeres permetezést. Nagy mértékben csökkenhet ezáltal az amerikai szőlőkabóca populáció, ami megbetegítheti a tőkéket.

A borvidéken a késői fajták megzsendültek a korai és középérésű fajták zsendülésérésben, kényszerérésben vannak.

A növényvédelmi előrejelző készülékek **erős lisztharmat veszélyt** jeleznek. A bogyók héja kezd elviaszosodni, melynek következtében a szőlőfürtök ellenálló képessége a lisztharmattal szemben egyre inkább érvényesül. Ez viszont nem azt jelenti, hogy védekezni ellene nem szükséges. Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt készítményekkel védekezni kell!

Peronoszpóra veszély jelenleg alacsony. Már csak preventív (megelőző) védekezés javasolható a közép- és késői érésű fajtáknál kontakt készítmények alkalmazásával.

(Mi a késői érésű fajta? Több, mint valószínű idén is a szőlőfajták zöme egybeérik.)

Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.

Feketerothadás veszélye alacsony védekezni ellene célzottan nem szükséges.

Peronoszpóra és a lisztharmat is már csak a lombozatot és a másodterméseket tudja megbetegíteni. Az egészséges fürtök már ellenállóak e két kórokozóval szemben.

25C° felett a növényvédő szerek perzselést okozhatnak!

Egyre gyakoribb az ESCA-s tőke a szőlőkben.

A fitoplazma tünetek is megjelentek. A fertőzött tőkék folyamatosan „dobják ki” a fitoplazma tüneteit. Megfigyelésem szerint a csonkázás nagymértékben befolyásolja a tünetek megjelenését. Csonkázás után pár nappal a régebben fertőzött tőkéken egyértelműen jelentkeznek a fitoplazma jellegzetes tünetei. **Eljött a harmadik rovarölőszeres kezelés ideje. A kezelést követően folyamatos „hegy” bejárásokat kell végezni!** A harmadik rovarölőszeres kezelést követően az újabb fertőzés gyanús tőkéket célszerű megjelölni, a hajtásokat levágni és lehetőleg minél hamarabb eltávolítani gyökerestől az ültetvényből a további fertőzés elkerülésének érdekében. Az ESCA-s szőlőtőkéket részleges amputálásokkal egypár évig, még tünetmentesen életben lehet tartani, de a **fitoplazmás tőkék esetében jelenleg nincsen gyógyítási lehetőség!**

Figyelem: Pénteken egy hidegfront várható. A hőség csütörtökön tetőzik 37- 42 °C maximum hőmérsékletekre lehet számítani. A hét második felében 26- 32 °C maximum hőmérséklet várható. Pénteken széllel párosuló hidegfront határozza meg az időjárást. Az időjárási előrejelzések alapján a mostani számítások szerint „jelentősebb” csapadék sajnos nem várható. Ettől függetlenül a légkör és az előrejelzések bizonytalanok, lokálisan bármikor főleg a délutáni órákban kialakulhat zápor zivatar is. A hosszabb távú előrejelzések alapján jövőhét elejétől ismét tartós hőségre lehet számítani.

A zöldmunkákat nem elhagyva, a napégést elkerülendő mérsékeltan levelezzenek a fűrtzónában. Lehetőség szerint a lombfal nyugati oldalán a napégés elkerülése érdekében ne levelezzenek.

A korai és középerésű fajtáknál a permetezési fordulók tervezésénél a használni kívánt növényvédő szerek kiválasztása az élelmezésegészségügyi várakozási idők figyelembevételével történjenek!

Az amerikai szőlőkabóca és potenciálisan veszélyt jelentő egyéb kabócák szempontjából felgyorsultak az események. már nem csak Badacsonyan hanem az egész borvidéken megtalálhatjuk az amerikai szőlőkabóca kifejlett egyedeit (imágókat). A tömeges rajzás elindult!

A két rovarölőszeres kezeléssel a helyben fejlődő lárváktól ültetvényeinket ki tudtuk „takarítani”, de a berepülő egyedektől nem. Szakmailag indokoltan ezért a 3. rovarölőszeres célirányosan a kifejlett kabócák elleni védekezést a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal újabb védekezési felhívását követően végezzék el, amely kiadásra került!

A rovarölő szerek alkalmazásakor kellő körültekintéssel járjanak el! Méhveszélyesség szempontjából vannak kritériumok, amikor egyes készítmények nem (virágzó gyomok, virágzó kultúra), vagy korlátozásokkal (méhkímélő technológia) alkalmazhatók.

Kedves Izabella és egyéb más direkttermő szőlő és alany tulajdonosok, legyen az út szélén, ültetvényben, vagy akár lugason kérem Önöket, hogy ha más ellen nem is, de amerikai szőlőkabóca ellen permetezzék meg a tőkéiket. Megfigyeléseink szerint nagyobb számú kabócalárva és majd a későbbiek során kifejlett egyed található rajtuk, mint az európai szőlőfajtákon.

Kérem, kísérjék figyelemmel a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal megjelent 2026/II. védekezési felhívását!

A benne foglaltak minden szőlőtulajdonos számára kötelező!

A KABÓCÁK ELLENI VÉDEKEZÉS KÖTELEZŐ, NEM EGYÉNI, HANEM KÖZÖS ÉRDEK! EGYSÉGES VÉDEKEZÉS NÉLKÜL NINCS VÉDELEM!

Növényvédő szer ajánlat tekintetében kérjük kereskedőjünk, növényvédelmi szakirányítójuk segítségét, akik nagy szakértelemmel, legjobb tudásuk szerint segítik összeállítani az aktuális kezeléshez szükséges növényvédő szereket.

Badacsony, 2026. 08. 05.